

Druppelschema rond uw staaroperatie HMC

Houdt u zich a.u.b. aan onderstaand druppelschema.

Druppelen van oogdruppels in het te opereren oog: Rechts/Links

- Na het toedienen van de oogdruppels drukt u uw traanbuis dicht
- Houd dit minstens 1 minuut vol
- Wacht minimaal 5 minuten voordat u de volgende druppel toedient.



Wanneer:	Oogdruppel: Dexamethason 0,1%	Oogdruppel: Nepafenac (Nevanac)	Oogdruppel: Yellox (Broomfenac)
2 dagen voor de operatie	4x per dag 1 druppel	1x per dag 1 druppel	2x per dag 1 druppel
1 dag voor de operatie	4x per dag 1 druppel	1x per dag 1 druppel	2x per dag 1 druppel
Ochtend van de operatie	1x per dag 1 druppel	1x per dag 1 druppel	1x per dag 1 druppel
1 ^e week na de operatie (Start de dag na de operatie)	4x per dag 1 druppel	1x per dag 1 druppel	2x per dag 1 druppel
2 ^e week na de operatie	3x per dag 1 druppel	1x per dag 1 druppel	2x per dag 1 druppel
3 ^e week na de operatie	2x per dag 1 druppel	Stop	Stop
4 ^e week na de operatie	1x per dag 1 druppel	Stop	Stop