

Geboortenaam	Naam huwelijkse partner	
Voorletters	☐ M ☐ V	
Voornaam	(bij kind of tweeling)	
Adres		
Postcode	Woonplaats	
Geb. datum	-	BSN
Nota	Zorgverzekeraar	
	Polisnr.	
	Arts	
	Instelling	

☐ Bezwaar tegen gebruik materiaal # ☐ Bij het inleveren van het materiaal/formulier gaat u akkoord met het aangevraagde onderzoek door HMC.

Klinische gegevens:	Datum afname	Tijdstip
☐ Bezoek buitenland naam land	Datum terugkomst in Nederland	
☐ Datum eerste ziektedag	belangrijk i.v.m. interpretatie	
Antibiotica gebruik laatste 48 uur	Antibioticum na afname kweek	
Indicatie bepaling/klinische gegevens		

Aankruisen in 1^e kolom. De letters A t/m G in 3^e kolom verwijzen naar het benodigde afnamemateriaal (zie achterzijde)

Acute keelpijn		
EBV (IgM, IgG, EBNA)		G
Groep A-streptococci		C
Controle na vaccinatie		
hepatitis A IgG		G
hepatitis B anti-HBs		G
Vaccinatie tegen		G
Diarree		
Diarree ¹ <14 dagen/ bloederige diarree (PCR bacterieel)		A
Diarree ¹ >14 dagen (PCR bacterieel + parasitair)		A
Aanhoudende buikklachten +/- diarree (PCR bact. + parasitair + wormeieren/cysten)		A
Reizigersdiarree ¹ (PCR bact + parasitair + wormeieren/ cysten)		A
Reizigers + aanhoudende buikklachten +/- diarree ¹ (PCR bacterieel + parasitair + wormeieren/ cysten + PCR strongyloides/ Schistosoma/ Cyclospora)		A
Norovirus		A
Rota-/Adenovirus		A
Yersinia		A
Clostridium difficile		A
Kweek		
Uitstrijk herkomst.....		C
Punctaat/ pus- herkomst.....		B
Leveraandoeningen		
Acute virale hepatitis (HAV, HBV, HCV, HEV, EBV*, CMV*) * indien eerste 4 negatief		G
Chronische virale hepatitis: ☐ HBV ☐ HCV		G
Luchtweginfectie		
Influenza + RSV PCR		C/D
Influenza + RSV + atypisch ¹		C/D
Atypisch ¹		C/D
Kinkhoest, symptomen < 3 weken (nasofarynx)		D
Kinkhoest, symptomen > 3 weken (serologie)		G
Pneumonie (sputum banale kweek)		B

Lyme		
Borrelia (IgG, IgM)		G
Lymfadenopathie		
EBV (IgM, IgG, EBNA)		G
CMV (IgM, IgG)		G
Toxoplasma (IgM, IgG)		G
Kattenkrab (Bartonella) (IgM)		G
Maagklachten		
Helicobacter pylori serologie (IgG)		G
Helicobacter feces antigeen test * * 2 weken voor afname zuurremming stoppen		A
Schimmelinfectie		
Schimmelmweek: nagel ☐ huidschilder ☐ haar		B
Pityriasis versicolor		B
Overige gistkweeken		C
SOA's en fluor		
Uitstrijk locatie		C
Urine		F
Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae (PCR)		F
Mycoplasma genitalium (PCR)		F
Trichomonas vaginalis (PCR)		F
SOA volledig (PCR) (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, N. gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis)		F
Bacteriële vaginose/vaginitis		C
Candida spp.		C
Herpes simplex (PCR)		C
HIV serologie		G
HBV serologie		G
Lues serologie		G
Subfertiliteit		
Chlamydia IgG		G

Urineweginfectie		
Midstream		E
Katheter urine		E
Zwangerschap		
Prenatale screening HBV/Lues/HIV A terme datum.....		G
Rubella IgG		G
Parvovirus IgG		G
Varicella IgG (indien anamnestic geen waterpokken of onbekend)		G
Dragerschap hemolytische groep B-streptococci		C
MRSA		
Kweek (keel, neus en perineum (3 uitstrijken))		C
PCR en kweek (sneldiagnostiek) (keel, neus en perineum (3 uitstrijken))		C
Bijzonder Resistente Micro-Organismen		
Bekend met		
Rectumuitstrijk		C
Urine		E
Andere locatie:		C
Overige bepalingen		
Parvovirus (IgM, IgG)		G
Groep A-streptococci serologie		G
Varicella (IgG, IgM)		G
Anders,		
.....		
.....		
.....		

Afnamemateriaal

A Steriele container met lepeltje	B Steriele container	C ESwab (roze dop)	D Nasofarynxwat (oranje dop)
			
E UriSwab	F SOA afnameset		G Bloedafname
	 Vaginale swab	 Unisex swab	 Urine speciemem
			

Uitgevoerde diagnostiek:

1. Feces bacterieel, standaard vindt PCR onderzoek plaats naar:

- *Salmonella spp.*
- *Campylobacter spp.*
- Shigella spp./ entero-invasieve *E.coli* (EIEC)
- Shiga-toxine producerende *E.coli* (STEC/EHEC)

Indien d.m.v. PCR een bacteriële verwekker wordt gedetecteerd, wordt het fecesmonster gekweekt om een gevoeligheidsbepaling uit te kunnen voeren.

2. Feces parasitair, standaard PCR onderzoek op:

- *Giardia lamblia*
- *Entamoeba histolytica*
- *Cryptosporidium hominis* / *parvum*

3. Atypisch, standaard onderzoek op:

- *Mycoplasma pneumoniae*
- *Chlamydia pneumoniae*
- *Chlamydia psittaci*
- *Legionella pneumophila*

NB: Reizigersdiarree is een infectie van het maagdarmkanaal die ontstaat tijdens of direct na een reis.