

Geboortenaam	Naam huwelijkse partner	
Voorletters	☐ M ☐ V	
Voornaam	(bij kind of tweeling)	
Adres		
Postcode	Woonplaats	
Geb. datum	-	BSN
Nota	Zorgverzekeraar	
Polisnr.		
Arts		
Instelling		

Klinische gegevens:	Datum afname	Tijdstip
☐ Bezoek buitenland naam land	Datum terugkomst in Nederland	
☐ Datum eerste ziekte dag	belangrijk i.v.m. interpretatie	
Antibiotica gebruik laatste 48 uur	Antibioticum na afname kweek	
Indicatie bepaling/klinische gegevens		

Aankruisen in 1^e kolom. De letters A t/m G in 3^e kolom verwijzen naar het benodigde afnamemateriaal (zie achterzijde)

Acute keelpijn	Lyme	Urineweginfectie
EBV (IgM, IgG, EBNA) G	Borrelia (IgG, IgM) G	Midstream E
Groep A-streptococci C	Lymfadenopathie	Katheter urine E
Controle na vaccinatie	EBV (IgM, IgG, EBNA) G	Zwangerschap
hepatitis A IgG G	CMV (IgM, IgG) G	Prenatale screening HBV/Lues/HIV A terme datum..... G
hepatitis B anti-HBs G	Toxoplasma (IgM, IgG) G	Rubella IgG G
Vaccinatie tegen G	Kattenkrab (Bartonella) (IgM) G	Parvovirus IgG G
Diarree	Maagklachten	Varicella IgG (indien anamnestic geen waterpokken of onbekend) G
Diarree ¹ <14 dagen/ bloederige diarree (PCR bacterieel) A	Helicobacter pylori serologie (IgG) G	Dragerschap hemolytische groep B-streptococci C
Diarree ¹ >14 dagen (PCR bacterieel + parasitair) A	Helicobacter feces antigeen test * * 2 weken voor afname zuurremming stoppen A	MRSA
Aanhoudende buikklachten +/- diarree (PCR bact. + parasitair + wormeieren/cysten) A	Schimmelinfectie	Kweek (keel, neus en perineum (3 uitstrijken)) C
Reizigersdiarree ¹ (PCR bact + parasitair + wormeieren/ cysten) A	Schimmelkweek: nagel ☐ huidschilder ☐ haar B	PCR en kweek (sneldiagnostiek) (keel, neus en perineum (3 uitstrijken)) C
Reizigers + aanhoudende buikklachten +/- diarree ¹ (PCR bacterieel + parasitair + wormeieren/ cysten + PCR strongyloides/ Schistosoma/ Cyclospora) A	Pityriasis versicolor B	Bijzonder Resistente Micro-Organismen
Noro-, Rota-, Adeno-, Astro-, Sapovirus PCR A	Overige gistkweeken C	Bekend met C
Yersinia A	SOA's en fluor	Rectumuitstrijk C
Clostridium difficile PCR A	Uitstrijk locatie C	Urine E
Kweek	Urine F	Andere locatie: C
Uitstrijk herkomst..... C	Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae (PCR) F	Overige bepalingen
Punctaat/ pus- herkomst..... B	Mycoplasma genitalium (PCR) F	Parvovirus (IgM, IgG) G
Leveraandoeningen	Trichomonas vaginalis (PCR) F	Groep A-streptococci serologie G
Acute virale hepatitis HAV, HBV, HCV, HEV, EBV, CMV G	SOA volledig (PCR) (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, N. gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) F	Varicella (IgG, IgM) G
Chronische virale hepatitis: ☐ HBV ☐ HCV G	Bacteriële vaginose/vaginitis C	Anders,
Luchtweginfectie	Candida spp. C	
Influenza + RSV PCR C/D	Herpes simplex (PCR) C	
Influenza + RSV + atypisch ¹ C/D	HIV serologie G	
Atypisch ¹ C/D	HBV serologie G	
Kinkhoest, symptomen < 3 weken (nasofarynx) PCR D	Lues serologie G	
Kinkhoest, symptomen > 3 weken (serologie) G	Subfertiliteit	
Pneumonie (sputum banale kweek) B	Chlamydia IgG G	

Afnamemateriaal

A Steriele container met lepeltje	B Steriele container	C ESwab (roze dop)	D Nasofarynxwat (oranje dop)
			
E UriSwab	F SOA afnameset		G Bloedafname
	 Vaginale swab	 Unisex swab	 Urine specimen
		 Bloedafname	

Uitgevoerde diagnostiek:

1. Feces bacterieel, standaard vindt PCR onderzoek plaats naar:

- *Salmonella spp.*
- *Campylobacter spp.*
- Shigella spp./ entero-invasieve *E.coli* (EIEC)
- Shiga-toxine producerende *E.coli* (STEC/EHEC)

Indien d.m.v. PCR een bacteriële verwekker wordt gedetecteerd, wordt het fecesmonster gekweekt om een gevoeligheidsbepaling uit te kunnen voeren.

2. Feces parasitair, standaard PCR onderzoek op:

- *Giardia lamblia*
- *Entamoeba histolytica*
- *Cryptosporidium hominis* / *parvum*

3. Atypisch, standaard onderzoek op:

- *Mycoplasma pneumoniae*
- *Chlamydia pneumoniae*
- *Chlamydia psittaci*
- *Legionella pneumophila*

NB: Reizigersdiarree is een infectie van het maagdarmkanaal die ontstaat tijdens of direct na een reis.