


Instructie MRSA onderzoek


HMC diagnostiek




Voor dit onderzoek zijn 3 afnames nodig: een neus-, keel-, en perineumkweek.




Neem een neuskweek af door het wattenstokje in te brengen in de neus en langs de binnenzijde van beide neusvleugels te strijken ('neuspeuter-gebied')




Open de buis en doe het wattenstokje erin. Breek de wattenstok af op het gekeurde afbreekpunt. Draai de dop stevig vast.




Vul de patiëntgegevens in op het etiket en noteer op welke plek van het lichaam de kweek is afgenomen. Plak de sticker in de lengterichting op het buisje.




Neem een keelkweek af door met een nieuwe wattenstok achterin de keel te strijken.




Vervolg met stap 3 en 4. Neem de perineumkweek af door een nieuwe wattenstok over de huid tussen de anus en de genitaliën te strijken. Vervolg met stap 3 en 4.




Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



Stop de afnamebuis met een absorptievel in de blister.



Stop de blister in de doorzichtige safetybag (plastic zakje). Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.



Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de verzendenvolp. Uw huisarts geeft de informatie over het inleveren bij een afgiftepunt of verzenden per post.